

Nastavení zvuku

Když nemáte otevřenou obrazovku Zvuk:

1. Na domovské obrazovce vyberte symbol **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK** nabídku **Nastavení** otevřete.

2. Držte tlačítko **OK** stisknuté, dokud nevidíte obrazovku **Zvuk**.

Symbol zvuku:

Při dodání je **zvuk** na glukometru **zapnutý**. Některé chybové zprávy nastavení **zvuku** anulují.

Když je **zvuk** **zapnutý**:

• Jedno dlouhé pípnutí znamená potvrzení.

• Dvě pípnutí znamenají chybu nebo něco, co vyžaduje vaši pozornost.

3. Pokud chcete přepnout **zvuk** na **On** (zapnuto) nebo na **Off** (vypnuto), stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼**.

4. Stiskněte tlačítko **OK**.

POZNÁMKA: Některé zvuky zůstanou **zapnuté**, i když **zvuk vypnete**. Pro vypnutí zvuku při zjištění hodnoty glukózy v krvi pod cílovou hodnotou přepněte nastavení **Světla cílové hodnoty** na **vypnuto**.

Glukometr zobrazí obrazovku **Symbol jidla**.

Baterie

Když jsou baterie slabé, glukometr funguje normálně a zobrazuje symbol **slabé baterie**, dokud baterie neumřetí.

Když již nebude možné měření provést, glukometr zobrazí obrazovku **Vybíte baterie**. Baterie okamžitě vyměňte.

Výměna baterií

Při výměně baterie se počít testů může lišit v závislosti na výrobci baterií.

1. Vypněte glukometr.

2. Plevratě je a vysušte zadní kryt ve směru šipky.

3. Vyměňte obě staré baterie a vyměňte je za dvě kulaté baterie 3V CR2032 nebo DL2032.

Přenos výsledků do aplikace

POZOR: Neprovádějte měření hladiny glukózy v krvi, když je glukometr **Contour Plus ONE** připojený k počítači.

Výsledky z glukometru **Contour Plus ONE** můžete automaticky bezdrátově přenést do svého chytrého telefonu nebo tabletu. Viz část 1 **Začínáme: Stážení aplikace Contour Diabetes** a podle pokynů aplikace proveďte spárování se svým glukometrem a můžete začít.

Přenos výsledků do osobního počítače

POZOR: Neprovádějte měření hladiny glukózy v krvi, když je glukometr **Contour Plus ONE** připojený k počítači.

Výsledky testů lze z glukometru **Contour Plus ONE** přenést do počítače, kde je lze shromádit do zprávy s grafy a tabulkami. K využití této funkce potřebujete software pro správu údajů o diabetu a kabel s konektory USB-A a mikro USB-B, dlouhý 1 metr (nebo 3 stopy). Tento typ kabelu je k dostání v prodejnách s elektronikou.

Ujistěte se, že dvířka portu USB u glukometru jsou zcela zavřená, pokud jej nepoužíváte.

POZOR: Používejte pouze vybavení schválené výrobcem nebo certifikovaným orgánem, např. UL, CSA, TÜV nebo CE.

Nastavení funkce Symboly jidla

Když nemáte otevřenou obrazovku **Symbol jidla**:

1. Na domovské obrazovce vyberte symbol **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK** nabídku **Nastavení** otevřete.

2. Držte tlačítko **OK** stisknuté, dokud nevidíte obrazovku **Symbol jidla**.

Symboly jidla:

Při dodání je funkce **Symboly jidla** na glukometru **vypnutá**.

3. Pokud chcete funkci **Symboly jidla** přepnout na **On** (zapnuto) nebo na **Off** (vypnuto), stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼**.

4. Stiskněte tlačítko **OK**.

POZNÁMKA: Pokud je funkce **Symboly jidla** **zapnutá**, můžete v průběhu měření hladiny glukózy v krvi vybrat **Symbol jidla**. Glukometr zobrazí obrazovku **Rozmezí cílové hladiny nálačno**.

Glukometr zobrazí **Rozmezí cílové hladiny** **před jídlem**.

Glukometr zobrazí **Rozmezí cílové hladiny** **před jídlem**.

Glukometr zobrazí **Rozmezí cílové hladiny** **před jídlem**.

5. Stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazení rozmezí cílové hladiny

O nastavení rozmezí cílové hladiny si promluvíte s odborným zdravotnickým pracovníkem.

Pokud je funkce **Symbol jidla** **zapnutá**, glukometr zobrazuje rozmezí cílové hladiny **Nálačno**. **Před jídlem**. Po jídle a **Celkové rozmezí cílové hladiny** v nabídce **Nastavení**.

POZNÁMKA: **Rozmezí cílové hladiny** můžete změnit pouze v aplikaci **Contour Diabetes**.

Když nemáte otevřenou obrazovku **Rozmezí cílové hladiny nálačno**:

1. Na domovské obrazovce vyberte symbol **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK** nabídku **Nastavení** otevřete.

2. Přidržíte tlačítko **OK** stisknuté, dokud nevidíte níže uvedenou obrazovku **Rozmezí cílové hladiny** **nálačno**.

3. Stiskněte tlačítko **OK**.

Glukometr zobrazí **Rozmezí cílové hladiny** **před jídlem**.

4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Glukometr zobrazí **Rozmezí cílové hladiny** **před jídlem**.

5. Stiskněte tlačítko **OK**.

Kontrolní roztok

Před testováním kontrolní roztok dobře protřepejte.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

Kontrolní test proveďte, pokud:

• používáte glukometr poprvé;

• otevřete novou lahvičku nebo nově balení testovacích proužků;

• domníváte se, že glukometr nepracuje správně;

• výsledky měření hladiny glukózy v krvi jsou opakovaně mimo očekávané rozmezí.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.

POZOR: Pouze kontrolní roztoky **Contour Plus** (normální, nízký a vysoký) je možné používat se systémem pro sledování hladiny glukózy v krvi **Contour Plus ONE** kvůli jiným kontrolním roztokům než **Contour Plus** může způsobit nepřesné výsledky.